

Botontkalking Osteoporose



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze folder vindt u informatie over osteoporose of botontkalking: het brozer worden van het bot, waardoor het bot minder weerbaar is en tot een breuk kan leiden.

We beschouwen osteoporose als een leeftijdsgebonden aandoening. Ook andere factoren zoals levensstijl, andere medische aandoeningen, medicatie, enz. spelen mee.

Er bestaat medicatie die het bot weer sterker kan maken waardoor het risico op breuken duidelijk daalt. Het vroegtijdig vaststellen van osteoporose is daarom erg belangrijk.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan aan uw huisarts of reumatoloog.

De artsen en medewerkers van de dienst reumatologie

1

Wat is osteoporose?

Normaalgezien is er een balans tussen de degradatie/afbraak van oud bot en de opbouw van nieuw bot.

Bij patiënten met osteoporose is dit evenwicht verstoord. De botten worden hierdoor poreus (zwakker) en breken daardoor makkelijker. Deze breuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor je beweeglijkheid en zelfredzaamheid.

Osteoporose op zich veroorzaakt geen pijn. De pijn treedt pas op bij een breuk.

- Wervelbreuken gaan vaak gepaard met rugpijn, vervormingen van de wervelkolom en kleiner worden. Een wervelbreuk kan optreden na een misstap, het heffen van een zwaarder voorwerp, val of na een langere hoestbui.
- Na het breken van een heup is een operatie meestal onvermijdelijk. Dit kan gepaard gaan met een vrij lange herstelperiode.
- Ook breuken ter hoogte van de pols kunnen ontstaan wanneer het bot brozer is geworden.

2

Bij wie komt osteoporose voor?

Botontkalking komt zowel bij mannen (vanaf 65 jaar of ouder) als bij vrouwen (na de menopauze) voor. Tijdens de overgangsjaren is er een daling van het vrouwelijk hormoon (oestrogeen) in het lichaam, waardoor er sneller botverlies optreedt.

Risicofactoren:

- laag lichaamsgewicht (BMI<19)
- vroegtijdige menopauze (<45 jaar)
- langdurige onmogelijkheid om te bewegen
- osteoporose komt vaak voor binnen de familie
- langdurig gebruik van corticoïden (in tabletten)
- reumatoïde artritis
- roken en overmatig gebruik van alcohol

3

Wat kan ik zelf doen?

Kies voor een dieet rijk aan calcium en vitamine D

Voorbeelden van calciumrijke voeding: zuivelproducten (melk, kaas, eieren, yoghurt), groene groenten (broccoli, spinazie...), peulvruchten (linzen, kikkererwten, bonen) of noten (amandelen, hazelnoten, walnoten).

Vitamine D wordt in het lichaam aangemaakt vanuit een cholesterolaafgeleide (vind je bijvoorbeeld in eigeel of vette vis). Actieve vitamine D wordt in ons lichaam aangemaakt via de huid (zonlicht) en de nieren.

Vermijd valpartijen

- Zorg voor goed passende gesloten schoenen, ook in huis. Vermijd slippers.
- Laat uw zicht regelmatig controleren.
- Vermijd tapijten of kabels op de grond. Laat niets liggen op de grond waarover u zou kunnen struikelen.
- Overloop met uw huisarts of u medicatie neemt die duizeligheid kan veroorzaken. Laat ook nakijken of uw bloeddrukmedicatie moet aangepast worden.

Zorg voor lichaamsbeweging

Probeer op regelmatige basis (bv. elke dag) te bewegen: wandelen, buiten fietsen of binnen op de hometrainer.

Stop met roken en beperk uw alcoholgebruik tot enkele consumpties per week

4

Voorafgaand

- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
- Trek **kledij** aan **zonder metaal** zoals ritsen, metalen knoppen, haakjes, beugels en gespen en draag geen juwelen
- Een DEXA-meting wordt liggend uitgevoerd met behulp van röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid röntgenstraling bij een DEXA-meting is zeer beperkt, zodat het risico op eventuele neveneffecten verwaarloosbaar is.

De opgelopen stralingsdosis ten gevolge van een DEXA-meting komt overeen met enkele uren blootstelling aan de natuurlijke achtergrondstraling. De voordelen van dit medisch onderzoek wegen dan ook op tegen de mogelijke risico's.

Ondanks de lage blootstelling van dit onderzoek, is het **niet wenselijk** om een DEXA-meting uit te voeren **tijdens de zwangerschap**. Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, vertel dit dan steeds aan een medewerker van de afdeling. Ontdekt u na het uitvoeren van de procedure dat u zwanger bent? Laat dit dan weten aan uw arts of gynaecoloog zodat een risico-inschatting kan worden gemaakt voor uw baby.

Op de volgende websites kunt u terecht voor meer uitgebreide info:

www.fanc.fgov.be
www.zuinigmetstraling.be

5

Hoe wordt de diagnose van osteoporose gesteld?

Botontkalking en de mate waarin het skelet brozer is geworden, kan het best vastgesteld worden via een botdensitometrie of 'dubbele-energie-röntgenabsorptiometrie (DEXA)-botdichtheidsmeting'. Met dit toestel wordt de densiteit/dichtheid van het bot gemeten.

Dit onderzoek is volledig pijnloos en de hoeveelheid straling is zeer beperkt. Het onderzoek duurt maar een 30-tal minuten. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Er wordt geen contrastvloeistof toegediend.

Het gemeten resultaat wordt vergeleken met de gemiddelde waarden volgens leeftijd en geslacht. Naargelang uw gemeten waarde verschilt met het verwachte gemiddelde, spreken we over osteopenie of osteoporose.

Een botdichtheidsmeting is niet bedoeld als een diagnostische test voor fractures maar als een risicomaat voor toekomstige fractures. Aan de hand van het gemeten resultaat zal de arts dus een risico-inschatting maken. Dit is vergelijkbaar met het meten van cholesterol en bloeddruk als risicofactor op hart- en vaatlijden.

Een botmeting wordt slechts om de 5 jaar terugbetaald en enkel in deze gevallen:

- bij breuken (behalve van schedel, halswervels, vingers of tenen)
- vrouwen ouder dan 65 jaar waarvan een familielid een gebroken heup heeft
- personen met bepaalde risicoaandoeningen

Het is nuttig de botmeting na 2 tot 5 jaar te herhalen.

6

Behandeling

Osteopenie of osteoporose

Als er sprake is van osteopenie of osteoporose wordt gestart met een calcium + vitamine D-supplement. Calcium en vitamine D zijn immers bouwstenen van het bot.

Er zijn verschillende supplementen verkrijgbaar:

- in kauwtablet: best in te nemen tussen de maaltijden of voor het slapen
- in poedervorm, op te lossen in water: hierbij kiest u zelf het tijdstip van inname

Dosering van het supplement is meestal: 1000 mg calcium + 800 eenheden vitamine D.

Als u ooit nierstenen heeft gehad, vermeldt u dit best aan uw (huis)arts.

Wanneer uit uw bloedonderzoek blijkt dat u een ernstig tekort heeft aan vitamine D, kan het nuttig zijn nog extra vitamine D-ampules in te nemen. Informeer bij uw huisarts hoe frequent dit nodig is. Zowel calcium als vitamine D mag u levenslang innemen.

Osteoporose

Bij osteoporose wordt ook gestart met een specifieke behandeling die het bot stimuleert om bot aan te maken. Deze behandeling dient voorgeschreven te worden door uw arts en wordt gecombineerd met de calcium + vitamine D-supplementen.

Sommige behandelingen worden terugbetaald via de adviserende arts van het ziekenfonds.

U bespreekt best met uw arts hoe lang u deze behandeling moet volgen.

7

Kostprijs

De kostprijs van dit onderzoek bedraagt 50 euro. Als u voldoet aan bepaalde criteria, kunt u in aanmerking komen voor terugbetaling van dit onderzoek éénmaal per 5 jaar. Voor meer details kunt u zich wenden tot uw ziekenfonds.

Na dit onderzoek is er een raadpleging bij de arts gepland waarbij de gebruikelijke tarieven per onderzoek gelden. De kostprijs hiervan is afhankelijk van uw statuut bij het ziekenfonds.

Vragen over de kostprijs? Neem een kijkje op www.fysische-geneeskunde-azdelta.be of www.azdelta.be of contacteer de dienst facturatie: factuur@azdelta.be - 051 23 76 66.

Notities

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contact

AZ DELTA CAMPUS BRUGSESTEENWEG

Brugsesteenweg 90

8800 Roeselare

Secretariaat reumatologie

t 051 23 61 45

e secr.fysio@azdelta.be

AZ DELTA CAMPUS RUMBEKE

Deltalaan 1

8800 Roeselare

Secretariaat reumatologie

t 051 23 77 18

e secr.fysio@azdelta.be

AZ DELTA CAMPUS MENEN

Oude Leielaan 6

8930 Menen

Secretariaat reumatologie

t 056 52 26 85

e secr.fysio@azdelta.be

AZ DELTA CAMPUS TORHOUT

Sint-Rembertlaan 21

8820 Torhout

Secretariaat reumatologie

t 050 23 24 92

e secr.fysio@azdelta.be

Reumaverpleegkundige

t 051 23 68 27

e reumaverpleegkundige@azdelta.be

www.azdelta.be

www.fysische-geneeskunde-azdelta.be

Bron: dienst reumatologie

Artsen

Dr. Ann Stuer

Dr. Caroline Verbist

Dr. Jean-Baptiste Vulsteke